


Утверждено

Директор ООО «ПОДИА»



Ветлугаева А.Н.

«11» января 2021 года



Ультразвуковые исследования (УЗИ) Функциональная диагностика (ФД)

Прайс лист

СОДЕРЖАНИЕ

УЗИ

Органов брюшной полости и забрюшинного пространства	3
Мочевыводящей системы	4
Органов малого таза	5
Фолликулометрия	5
Молочных желез ♀	6
Грудных желез ♂	6
Предстательной железы (простаты)	7
Щитовидной и паращитовидных желез	8
Лимфатической системы	8
Скелетно-мышечной системы	8
Сердца и сосудов	9

Функциональная диагностика

Исследования сердечно-сосудистой системы

Эхокардиография (ЭхоКГ)	11
Электрокардиограмма (ЭКГ)	11

Исследования функций дыхания

Спирометрия и пикфлоуметрия	12
Определение концентрации оксида азота	13

Гастроэнтерологические тесты

Определение бактерии <i>Helicobacter pylori</i>	14
Исследование функционального состояния кишечника	15

Прочие измерения

Антропометрия (измерение роста, массы, температуры тела)	16
Пульсоксиметрия	16
Диагностика состава тела (импедансометрия)	17



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства

За 2-3 дня до УЗИ необходимо исключить из рациона продукты, вызывающие газообразование.

За 6-8 часов до УЗИ должно быть последнее употребление пищи. Исследование проводится натощак.

За 3-4 часа до УЗИ должно быть последнее кормление младенца.

До УЗИ желчного пузыря рекомендуется очистить кишечник от каловых масс.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
B03.052.001	Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, печень, сосуды печени, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа, забрюшинные лимфоузлы)	2 400	40 мин.
A04.14.001.003	Комплексное УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, сосуды печени, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа)	1 900	30 мин.
A04.30.004.001	УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости	650	10 мин.
A04.14.002.001	УЗИ желчного пузыря с определением функции	2 550	до 90 мин.



УЗИ мочевыводящих путей

За 6-8 часов до УЗИ должно быть последнее употребление пищи. Исследование проводится натощак.

За 1 час до УЗИ мочевого пузыря необходимо выпить 1 литр негазированной жидкости. Перед процедурой УЗИ мочевого пузыря должен быть полон.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ВЫПОЛНЕНИЕ
A04.28.001	УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря	1 400	15-20 мин.
A04.28.002.005	УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи	1 400	20 мин.
B03.052.001.003	Комплексное УЗИ мочевыделительной системы с определением остаточной мочи (почки, надпочечники, мочеточники, мочевого пузыря)	2 100	20-30 мин.



УЗИ органов малого таза

за 3-5 часов до трансректального УЗИ необходимо опорожнить кишечник, для чего следует применить клизму.

за 1 час до трансабдоминального УЗИ необходимо выпить 1 литр негазированной жидкости.

Артикул	Наименование	Цена, ₽	Длительность
A04.20.001	УЗИ матки и придатков трансабдоминальное	1 500	15 мин.
A04.20.001	УЗИ матки и придатков трансабдоминальное с цветным доплеровским картированием (ЦДК)	2 200	15 мин.
A04.20.001.002	УЗИ матки и придатков трансректальное	1 800	15-20 мин.
A04.20.001.001	УЗИ матки и придатков трансвагинальное	1 800	10-15 мин.
A04.20.003	УЗ-диагностика беременности	1 400	15 мин.

Фолликулометрия

- Помогает оценить рост и развитие фолликулов при естественном менструальном цикле и при лекарственной стимуляции яичников, спрогнозировать дату овуляции, подобрать оптимальный день для зачатия. Проводится несколько раз, начиная с 5-6-го дня цикла, по назначению врача.

Артикул	Наименование	Цена, ₽	Длительность
B01.002.001	Мониторинг созревания фолликула – фолликулометрия, 1 исследование	700	10-15 мин.



УЗИ молочных желез ♀

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A04.20.002.011	УЗИ молочных желез и лимфатических узлов подмышечных областей	1 600	30 мин.
A04.20.002.122	УЗИ молочных желез и лимфатических узлов подмышечных областей с цветным доплеровским картированием (ЦДК)	2 000	30 мин.

УЗИ грудных желез ♂

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A04.20.002.012	УЗИ грудных желез и лимфатических узлов подмышечных областей	1 600	20 мин.



УЗИ предстательной железы (простаты)

За 3-5 часов до трансректального УЗИ необходимо опорожнить кишечник, для чего следует применить клизму.

За 1 час до трансабдоминального УЗИ необходимо выпить 1 литр негазированной жидкости.

> Чтобы не испытывать дискомфорт после УЗИ мошонки, мужчинам рекомендуют сбривать волосы в области паха.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A04.28.003	УЗИ органов мошонки	1 200	15 мин.
A04.21.001.011	УЗИ предстательной железы трансабдоминальное и органов мошонки	1 900	15-25 мин.
A04.21.001.001	УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ)	1 600	15-20 мин.
A04.21.001.002	УЗИ предстательной железы трансректальное с цветным доплеровским картированием (ЦДК)	2 100	20 мин.



УЗИ щитовидной и паращитовидных желез

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A04.22.001.002	Комплексное УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов шеи	1 600	20 мин.
A04.22.001.003	Комплексное УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов шеи с цветным доплеровским картированием (ЦДК)	1 900	15 мин.

УЗИ лимфатической системы

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A04.06.002	УЗИ регионарных лимфатических узлов, 1 анатомическая зона (подчелюстные, шейные, подлопаточные, надключичные, подмышечные, загрудинные, паховые)	1 100	15 мин.

➤ При прохождении УЗИ нескольких лимфатических узлов за одно посещение, действуют скидки

УЗИ скелетно-мышечной системы

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A04.01.001.100	Дуплексное сканирование (УЗДС) мягких тканей, 1 анатомическая зона	900	20 мин.



Узи сердца и сосудов

За 1-2 дня до УЗИ минимизируйте воздействие факторов, которые могут влиять на состояние сердечно-сосудистой системы. Желательно не пить крепкий чай, кофе и энергетические напитки.

Артикул	Наименование	Цена, ₽	Длительность
A04.12.005.114	Дуплексное сканирование (УЗДС) вен верхней конечности с цветным доплеровским картированием (ЦДК) 1 рука	1 500	30 мин.
A04.12.005.104	Дуплексное сканирование (УЗДС) вен верхних конечностей с цветным доплеровским картированием (ЦДК) 2 руки	2 400	30 мин.
A04.12.006.112	Дуплексное сканирование (УЗДС) вен нижней конечности с цветным доплеровским картированием (ЦДК) 1 нога	2 000	30 мин.
A04.12.006.102	Дуплексное сканирование (УЗДС) вен нижних конечностей с цветным доплеровским картированием (ЦДК) 2 ноги	2 750	30 мин.
A04.12.005.003	Дуплексное сканирование (УЗДС) брахиоцефальных артерий (БЦА) с цветным доплеровским картированием (ЦДК)	2 550	30 мин.
A04.10.002.001	Эхокардиография (ЭхоКГ) с цветным доплеровским картированием (ЦДК)	2 900	40 мин.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Исследования сердечно-сосудистой системы

За **1-2**
дня

до ЭхоКГ / ЭКГ минимизируйте воздействие факторов, которые могут влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.
Желательно не пить крепкий чай, кофе и энергетические напитки.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A04.10.002.001	Эхокардиография (ЭхоКГ) с цветным доплеровским картированием (ЦДК)	2 900	40 мин.
A05.10.006	Регистрация (снятие) электрокардиограммы (ЭКГ)	500	10 мин.
A05.10.005	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	500	10 мин.
A05.10.004	Регистрация и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ)	750	15 мин.
A05.10.008	Суточное мониторирование электрокардиограммы (ЭКГ) по Холтеру	3 400	в течение 1 суток



Дыхательные тесты

Исследования функций дыхания

- За 48 часов** до теста нельзя пользоваться противоаллергическими препаратами.
- За 24 часа** до теста необходимо исключить теофиллин, эуфиллин и подобные препараты.
- За 8 часов** до теста нельзя пользоваться ингаляционными бронхорасширяющими препаратами, следует отказаться от чая, кофе и кофеинсодержащих напитков.
- За 3-5 часов** до теста должно быть последнее употребление пищи. Исследование проводится натощак. Во время последнего приема пищи не следует переесть.
- За 2 часа** до теста необходимо отказаться от курения.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A12.09.002	Исследование функции внешнего дыхания с помощью спирометра	1 500	30 мин.
A12.09.002.001	Исследование функции внешнего дыхания с помощью спирометра с бронхолитиком	1 700	60 мин.
A12.09.001.001	Исследование функции внешнего дыхания с помощью пикфлоуметра	500	15 мин.



Определение концентрации оксида азота

За 6-12 часов до теста нельзя пользоваться ингаляционными бронхорасширяющими препаратами.

За 3-5 часов до теста должно быть последнее употребление пищи. Исследование проводится натощак. На это же время желательно отказаться от курения и крепкого кофе.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A12.09.009	Исследование оксида азота (NO) в выдыхаемом воздухе	1 500	30 мин.



Гастроэнтерологические дыхательные тесты

Определение бактерии *Helicobacter pylori*

- За 1 месяц** до теста нельзя принимать антибиотики.
- За 14 дней** до теста необходимо исключить прием препаратов, которые подавляют течение физиологических и ферментативных процессов в организме.
- За 12 часов** до теста следует отказаться от употребления жевательной резинки.
- За 6-8 часов** до теста должно быть последнее употребление пищи. Исследование проводится натощак. Во время последнего приема пищи не следует переесть, пища не должна содержать клетчатку.
- За 1 час** до теста нельзя пить.
- До** начала теста необходимо почистить зубы и ротовую полость.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A07.16.006	Дыхательный тест на определение <i>Helicobacter pylori</i>	1 200	30 мин.



Исследование функционального состояния кишечника



Тест нельзя проводить при доказанной наследственной непереносимости фруктозы, имеющейся гипогликемии голодания или подозрении на нее.

**За 1
месяц**

до теста нельзя принимать антибиотики.

**За 14
дней**

до теста необходимо исключить прием препаратов, которые подавляют течение физиологических и ферментативных процессов в организме.

**За 24
часа**

до теста из рациона следует исключить капусту, бобовые, лук и маринованные овощи, нежелательно употреблять молочные продукты и соки.

**За 14
часов**

до теста должно быть последнее употребление пищи. Исследование проводится натощак. Во время последнего приема пищи не следует переесть, пища не должна содержать клетчатку.

**За 12
часов**

до теста следует отказаться от употребления жевательной резинки.

До

начала теста необходимо почистить зубы и ротовую полость.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ФД-001	Водородный дыхательный тест с лактозой	1 800	120-180 мин.
ФД-002	Водородный дыхательный тест с лактулозой	1 800	120-180 мин.
ФД-003	Водородный дыхательный тест с фруктозой	1 800	120-180 мин.
ФД-004	Водородный дыхательный тест с глюкозой	1 800	120-180 мин.



Прочие измерения

Антропометрия

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
B03.002.004.128	Антропометрия (измерение роста, массы, температуры тела, окружности груди и живота)	100	15 мин.

Пульсоксиметрия

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ₽	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
A12.09.005.100	Пульсоксиметрия (пальцевая) (неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом)	200	15 мин.



Диагностика состава тела

На основании данных биоимпедансометрии приблизительно оценивают следующие показатели:

- Индивидуальное значение идеального веса.
- Количество жировой ткани в килограммах и в отношении к общему весу.
- Количество внеклеточной жидкости (кровь, лимфа).
- Количество внутриклеточной жидкости.
- Количество жидкости, находящейся в организме в связанном состоянии (в отёках).
- Количество в килограммах и процентах активной клеточной массы (мышцы, органы, мозг и нервные клетки).
- Индекс массы тела (ИМТ).
- Основной обмен веществ (ккал) – обмен веществ за 24 часа в состоянии покоя.
- Отклонение измеренных величин от нормы.
- Проследить динамику изменений.

Артикул	Наименование	Цена, ₽	Длительность
A02.01.001.102	Биоимпедансометрия	1 200	15 мин.

